



Edinburgh & Lothians
Health Foundation

EVOC



获取最新信息 常问问题

有关最新信息：

NHS Inform at

<https://www.nhsinform.scot/coronavirus>



1

冠狀病毒疫苗

任何感染 COVID-19 的人都可能患重病或產生長期影響（長期 COVID）。

COVID-19 疫苗是保護自己和他人的最佳方式。

研究表明，疫苗有助於：降低因 COVID-19 患重病或死亡的風險，降低感染或傳播 COVID-19 的風險並預防 COVID-19 變種。

第 1 劑應在您接種後 3 或 4 週內為您提供一些保護。但是您需要接種 2 劑才能獲得更強大和更持久的保護。即使您接種了疫苗，您仍有可能感染或傳播 COVID-19，因此繼續遵循所有社交距離指南非常重要。





新型冠狀病毒疫苗

目前批准在英國使用的 COVID-19 疫苗是：

莫德納疫苗

牛津/阿斯利康疫苗

輝瑞/BioNTech 疫苗

楊森疫苗



2

3 我會接種哪種疫苗？

您通常不能選擇您的疫苗。當您預訂時，您只會得到適合您的疫苗的預約。大多數人可以接種任何 COVID-19 疫苗，但有些人只能接種某些疫苗。例如，如果您懷孕或未滿 40 歲，通常只會為您預約 輝瑞/BioNTech 或 莫德納 疫苗。除非您在接種第一劑後出現嚴重的副作用（例如嚴重的過敏反應），否則您應該接種兩劑相同的疫苗。



副作用和安全性

4

接種疫苗後出現副作用是正常的。這表明疫苗正在教會您身體的免疫系統如何保護自己免受疾病侵害，但並不是每個人都會有副作用。

任何副作用通常都是輕微的，持續時間不應超過一周，例如：注射後手臂酸痛、感覺疲倦、頭痛、感覺疼痛、感覺作嘔和發燒。

更嚴重的副作用，如過敏反應或凝血，非常罕見。



非常罕見的血凝塊報告

5

MHRA 正在對非常罕見的凝血問題的報告進行詳細審查，該問題影響了少數接種過牛津/阿斯利康疫苗的人。

這個問題也可能發生在沒有接種疫苗的人身上，目前尚不清楚為什麼會影響某些人。

2021 年 5 月 7 日，疫苗接種和免疫聯合委員會表示，迄今為止，總體而言，每接種 100 萬劑阿斯利康疫苗，就有超過 10 人患上這種疾病。冠狀病毒疫苗可以幫助您避免重病或死于冠狀病毒。

對於 40 歲或以上的人和有潛在健康問題的人來說，接種疫苗的好處大於凝血問題的任何風險。

對於 40 歲以下沒有潛在健康問題的人，目前建議最好接種另一種冠狀病毒疫苗，而不是牛津/阿斯利康疫苗。

nhsinform.scot/covid-19-vaccine/the-vaccines/side-effect-of-the-coronavirus-vaccines



6

COVID-19 疫苗與懷孕和母乳喂養

孕婦和新生兒感染冠狀病毒後的風險通常很低。但是，如果孕婦符合以下條件，則更有可能感染嚴重的冠狀病毒 (COVID-19)：

有潛在的健康狀況（例如糖尿病、高血壓或哮喘）

超重

是黑人和亞洲少數民族背景

年齡在 35 歲或以上

與大多數藥物和疫苗一樣，尚未對孕期冠狀病毒疫苗進行大規模臨床試驗。

然而，現有數據並未表明對懷孕有任何危害。

英國現有的冠狀病毒疫苗已被證明是有效和安全的。您和您未出生的嬰兒不會通過疫苗感染冠狀病毒。

疫苗接種和免疫聯合委員會 (JCVI) 建議所有孕婦應與同齡或風險群組的人同時接種冠狀病毒疫苗。



COVID-19 疫苗和穆斯林社區

英國伊斯蘭醫學協會向穆斯林社區推薦輝瑞/BioNTech、牛津/阿斯利康和莫德納疫苗。他們還建議，接種 COVID-19 疫苗不會使禁食無效。

傳染病、病毒學、藥物學、臨床醫生、專員、公共衛生官員和生物倫理學家的伊斯蘭信仰專家研究了疫苗，並將他們的研究結果傳遞給了各種教派的伊斯蘭學者。

英國伊斯蘭醫學協會 (BIMA) 表示，穆斯林社區的人是該國死於 Covid-19 或患上 Covid-19 的風險最高的人，其中也是最猶豫接種的人，這說明為什麼在穆斯林社區中傳達明確統一的信息至關重要，即疫苗是安全的。



保護我們所有人，需要我們所 有人。 >>>

請記住，在您接種疫苗後，遵循以下事項仍然很重要：

面罩；

避開人群；

清潔雙手；

兩米距離；

自我隔離。

有关最新信息：

NHS Inform

<https://www.nhsinform.s>



cot/coronavirus